

USO DEI MEDICINALI

Basato sulla norma MSN1768 - utilizzare consultando la "Ship Captain's Medical Guide"

No.Rif.	Medicinale	Caratteristiche ed Uso	Dosi/Somministr.
1. Cardio-Vascolari			
(a)	Adrenalina (Epinephrine) iniezione 0,5ml (1 in 1000)	Stimolatore Cardiaco in caso di Shock Anafilattico (allergia grave con collasso)	0,5 to 1,0 ml per Iniez. IM
<i>Effetti collaterali: Ansia, tremore, innalzam.pressionesanguigna, battito accelerato ed irregolare. Usare solo su pazienti in gravi condizioni, con caduta di pressione sanguigna / gravi problemi respiratori.</i>			
(b)	Nitroglicerina (GTN) Spray 400 microgmg inalatore calibrato	Anti-angina (dolore cardiaco), sospetto attacco cardiaco o dolore cardiaco	1-2 inalazioni sotto la lingua
<i>Effetti collaterali: Mal di testa martellante, pallore, capogiro, svenimento, bassa pressione sanguigna.</i>			
2. Gastro-Intestinali			
(a)	Preparato Anti Acido	Preparati anti-indigestione per bruciore di stomaco, Dispepsia, ecc.	Seguire Istruzioni sulla
(b)	Proclorperazina 3mg compresse per bocca	Medicinale anti-nausea usato contro malesseri causati da problemi alle orecchie (vertigini) o causati da droghe, p.es.	3mg (1 comp.) s. lingua 2xgiorno
<i>Effetti collaterali: Dry mouth, blurred vision, rapid pulse</i>			
(d)	Loperamide 2mg compresse	Controllo della diarrea	4mg inizialm. poi 2mg dopo ogni scarica
<i>Effetti collaterali: Sonnolenza, capogiro, crampi addominali</i>			
(e)	Prometazina 25mg iniezione	Medicinale anti-nausea ed antistaminico utile per gravi malesseri da moto o per gravi reazioni allergiche.	25mg (1 amp) per Iniez. IM
<i>Effetti collaterali: Sonnolenza, bocca secca, vista annebbiata.</i>			
(f)	Cinnarizina 15mg	Medicinale anti-nausea usato contro malesseri da movimento.	15 mg (1 comp.) ogni 8 ore
<i>Effetti collaterali: Stanchezza, bocca secca, vista annebbiata.</i>			
3. Analgesici ed antispasmodici			
(a)	Paracetamolo 500mg compresse	"Semplice" antidolorifico adatto per la maggior parte dei dolori leggeri o moderati.	1gm (2 comp) ogni 4 ore
<i>Effetti collaterali: Rari nei dosaggi corretti, molto pericoloso in overdose e velenoso per il fegato.</i>			
(b)	Codeina Fosfato 30 mg compresse	Forte antidolorifico adatto per dolori moderati o forti.	30mg (1 comp.) ogni 6 ore
<i>Effetti collaterali: Nausea, vomito, costipazione, depressione respiratoria in caso di overdose</i>			
(d)	Ibuprofen 400mg	Antidolorifico ed anti-infiammatorio, adatto per mal di testa e dolori agli arti	400mg (1 comp.)
<i>Effetti collaterali: Dolori di stomaco, nausea, affanno. Non somministrare a pazienti affetti da ulcera a stomaco/duodeno o da</i>			
(e)	Tramadol iniezione 100mg	Antidolorifico medio, adatto a dolori moderati o moderatamente forti	100mg (1 amp) x IM ogni 6 ore
<i>Effetti collaterali: Capogiro, sonnolenza, visione annebbiata, agitazione. Depressione respiratoria in caso di overdose.</i>			
4. Sistema Nervoso			
(d)	Diazepam erogatore rettale 10mg	Medicinale anti-epilettico usato per controllare gli spasmi	10mg p.via rettale max 2
<i>Effetti collaterali: Sonnolenza, capogiro, confusione, mal di testa, depressione respiratoria. Non abbinare a forti antidolorifici.</i>			
5. Anti-allergici ed anti-anafilattici			
(b)	Idrocortisone 100mg iniezione (da diluire in 2mls)	Steroide anti-allergico per allergie severe con sintomi gravi o collasso.	100mg x Iniez.IM ogni 8 ore se
<i>Effetti collaterali: Few for single dose or short course</i>			
(c)	Prednisolone 5mg compresse	Steroide anti-allergico ed efficace trattamento dell'asma acuta	5-20mg 1 volta/di ripetere x asma grave
<i>Effetti collaterali: Rari a seguito di somministrazione singola o ciclo di breve durata</i>			

No.Rif.	Medicinale	Caratteristiche ed Uso	Dosi/Somministr.
6. Sistema Respiratorio			
(a)	Salbutamolo inalatore 100microg in dose calibrata	Medicinale anti-broncospasmi (affanno) usato nel trattamento dell'asma e del raffreddore allergico	2 inalazioni 3-4 volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Tremore, mal di testa, aumento del battito cardiaco</i>			
(c)	Paracetamolo 500mg compresse	vedere 3(a)	
7. Anti-infezione			
(c)	Trimetoprim 200mg compresse	Antibiotico utile nel trattamento delle infezioni del tratto urinario e della bronc useful for treatment of urinhite	200mg due volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Nausea, vomiting and diarrhoea, rashes.</i>			
(d)	Mebendazolo 100mg compresse	Medicinale anti-parassitario per il trattamento di infestazioni addominali ("vermi")	100 mg single dose
<i>Effetti collaterali: Rare</i>			
(e)	Metronidazolo 400mg compresse	Antibiotico adatto per infezioni protozoiche o amebiche. Utile in infezioni addominali.	400mg (1 comp.)
<i>Effetti collaterali: Nausea, vomito, sapore cattivo, eruzioni cutanee. Evitare l'alcool.</i>			
(f)	Ciprofloxacina idrocloride 500mg compresse	Antibiotico ad ampio spettro	500mg 2 volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Nausea, diarrea, dolori addominali, eruzioni cutanee, reazioni allergiche.</i>			
(g)	Eritromicina 250mg compresse	Antibiotico ad uso generale, utile in pazienti allergici alla penicillina	250-500mg ogni 6 ore
<i>Effetti collaterali: Nausea, diarrea, eruzioni cutanee, reazioni allergiche. Usare con cura in pazienti allergici alla penicillina.</i>			
8. Composti per la reidratazione			
(a)	Sacchetti di Sali per reidratazione orale	Usato per trattare la disidratazione in presenza di vomito e diarrea o grave indisposizione.	Seguire Istruzioni sulla
<i>Effetti collaterali: Nessuno</i>			
9. Medicine per uso esterno			
(a)	Soluzione o fazzolettini antisettici	Per pulire ferite superficiali e per disinfezione	Seguire Istruzioni sulla
<i>Effetti collaterali: Nessuno se non applicato su grandi aree</i>			
(e)	Crema di Idrocortisone 1% 15mg tubetto	Leggera crema steroide anti-infiammatoria. Utile in eruzioni cutanee (p.es. eczema), eruzioni allergiche, punture di insetti, ecc.	Applicare sulla zona, max 3 volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Può agevolare la diffusione dell'infezione. Non applicare su ferite aperte o piaghe causate da infezioni della</i>			
(f)	Miconazolo Nitrate 2% crema 30gm tubetto	Crema per il trattamento delle affezioni fungali della pelle.	Sull'area affetta, 2 volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Rari, nessuno in uso normale</i>			
(g)	Silver Sulphadiazina 1% crema 50mg tubetto	Crema antibatterica per la protezione contro le infezioni nelle bruciature.	Sulla bruciatura, sia fasciata che scoperta
<i>Effetti collaterali: Reazioni allergiche, bruciore, prurito. Inconsueti.</i>			
(h)	Cloramfenicolo collirio 1%	Antibiotico oculare per uso generico utile in caso di corpo estraneo piccola ferita o congiuntivite.	Instillare 3-4 volte al giorno
<i>Effetti collaterali: Inusuali, ma può causare irritazione dell'occhio</i>			
(i)	Ametocaina Idroclorito 0,5% gocce per gli occhi	Anestetico locale per gli occhi in gocce. Utile per desensibilizzare l'occhio prima di rimuovere corpi estranei o per dolore acuto.	1-2 gocce, da non ripetere
<i>Effetti collaterali: Rari per singolo uso. Attenzione ad evitare ferite all'occhio insensibile.</i>			
(j)	Fluorescina sodio 1% gocce per gli occhi	Usato per individuare graffi o lesioni della cornea.	1-2 gocce per esame
<i>Effetti collaterali: Nessuno nell'uso normale.</i>			
(k)	Linocaina Idroclorito 1% 25mg in 5ml iniezione	Anestetico locale da iniettare prima del trattamento di piccole ferite	iniettare intorno alla ferita 2-5ml, max 20ml
<i>Effetti collaterali: Convulsioni, problemi cardiaci in caso di overdose</i>			
(m)	Olio di chiodi di Garofano (Oil of cloves) 10ml bottiglia	Olio naturale con proprietà di anestetico locale utile nel trattamento del mal di denti	Piccola quantità sul dente affetto